

Blodprøver og Biokemi

Dato: 09.02.2024

Side: 1 af 2

Til
Klinisk biokemiske afdelinger i Region Midt

Nye analyser til terapeutisk drug monitorering: Lurasidon, Brexpiprazol og Cariprazin

Baggrund

Efter ønske fra Psykiatrien har vi oprettet nedenstående analyser til brug for terapeutisk drug monitorering, som kan rekvireres fra 21. februar 2024:

P-Lurasidon

P-Brexpiprazol

P-Cariprazin

Blodprøven tages som dalværdi umiddelbart før næste medicinindtag.

Vejledende terapeutiske intervaller og ringegrænser er som følgende:

Analysenavn	Vejledende terapeutiske interval	Ringegrænse
P-Lurasidon	30-81 nmol/L	> 247 nmol/L
P-Brexpiprazol	92-323 nmol/L	> 647 nmol/L
P-Cariprazin	23-47 nmol/L	> 93 nmol/L

Kilde: Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Hiemke at al. Pharmacopsychiatry. 2018 Jan;51(1-02):9-62. doi: 10.1055/s-0043-116492

Svartid

Svartid 1-2 uger

Yderligere information

Oplysninger om analysen kan findes på www.analysefortegnelsen.dk for AUH under analyserne P-Lurasidon, P-Brexpiprazol, eller P-Cariprazin.

Dato: 09.02.2024

Side: 2 af 2

Spørgsmål kan rettes til:
Overlæge Elke Hoffmann-Lücke

elkehoff@rm.dk

tlf. 23827497

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson
Cheflæge

Kate Juul Strandgaard
Chefbioanalytiker