

Blodprøver og Biokemi

Til
Hormon- og Knoglesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital
Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

Indførsel af cut-off for P-Thyroid-peroxidase-antistof

Baggrund

Pr. 2.3.26 indføres et cut-off for analysen P-Thyroid-peroxidase-antistof.

Referenceintervallet ændres hos voksne fra $< 35 \times 10^3$ int.enh./l og hos børn fra $< 25 \times 10^3$ int.enh./l til et **fælles cut-off på 20×10^3 int.enh./l**. Ændringen er baseret på leverandørens oplysninger efter skift til ny generation af nuværende målemetode samt patient-data fra vores BI-portal.

Yderligere information

Oplysninger om P-Thyroid-peroxidase-antistof kan findes på www.analysefortegnelsen.dk for AUH.

Analysetekniske spørgsmål kan rettes til:
Overlæge Tina Parkner, tinpar@rm.dk, tlf. 5184 6817

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson Cheflæge	Holger Jon Møller Lærestolsprofessor	Kate Juul Strandgaard Chefbioanalytiker
------------------------	---	--