

Dato: 6.8.2026

Side: 1 af 1

Til
Blodsygdomme, AUH
Hormon- og Knoglesygdomme (Diagnostisk Klinik), AUH
Blodprøver og Biokemi, HEM/Randers/Horsens

Nye referenceintervaller for frie lette kæder pr. 1/9-2026

Fra den 1. september 2026 indføres nye referenceintervaller for følgende analyser:

- P-Kappa-kæde(Ig) frit (NPU19607)
- P-Lambda-kæde(Ig) frit (NPU19606)
- P-Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit (NPU19608)

De nye referenceintervaller bygger på resultater fra det store *Iceland Screens, Treats, or Prevents Multiple Myeloma* (iStopMM)-studie og anbefales i den nationale kliniske retningslinje udarbejdet af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Myelomatose Studieggruppe.

Referenceintervallerne afhænger af patientens alder og nyrefunktion, hvorfor der ved rekvisition af ovenstående analyser automatisk tilføjes P-Kreatinin og eGFR.

Ved estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) under 60 mL/min vil analysesvaret indeholde en svarkommentar med de relevante referenceintervaller. Bemærk, at den automatiske referencevurdering (rød markering) af tekniske årsager fortsat sker ud fra referenceintervallerne for patienter med normal nyrefunktion. Ved eGFR <60 mL/min bør resultatet dog vurderes ud fra svarkommentaren.

Beslutningsgrænserne for P-Kappa/Lambda frit (OBS Myelomatose) (AAB00531), som anvendes i almen praksis, ændres ikke.

Yderligere information

Oplysninger om analysen kan findes på www.analysefortegnelsen.dk.

Analysetekniske spørgsmål kan rettes til:

Overlæge Anders M. Abildgaard, AUH
Overlæge Rie McGrail, RHG

andeabil@rm.dk

rie.mcgrail@goedstrup.rm.dk

tlf. 2328 7458

tlf. 2910 4770

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson
Cheflæge

Holger Jon Møller
Lærestolsprofessor

Kate Juul Strandgaard
Chefbioanalytiker