

Blodprøver og Biokemi

Dato: 28.04.2022

Side: 1 af 1

Til
Kliniske Biokemiske Afdelinger, Region Midt
Psykiatriske afdelinger, Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland

Ændring i terapeutisk interval for P-Clozapin

Baggrund

For alle antipsykotika gælder, at det terapeutiske interval er orienterende i den forstand, at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.

Efter Psykiatriens Lægemiddelkomites anbefaling justeres det terapeutiske interval til 1070-3057 nmol/L i overensstemmelse med "The Clozapine Handbook" af Jonathan Meyer og Steven Stahl fra 2020.

Desuden hæves ringegrænsen, som indikerer en mulig forgiftning, fra 3000 nmol/L til fremover 3500 nmol/L.

Ændring

Fra 25. april 2022 ændres det terapeutiske interval for P-Clozapin til 1070-3000 nmol/L. Ringegrænse løftes til 3500 nmol/L.

Yderligere information

Oplysninger om de enkelte analyser kan findes på www.analysefortegnelsen.dk.

Spørgsmål kan rettes til:
Overlæge Elke Hoffmann-Lücke

elkehoff@rm.dk

tlf. 23827497

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson
Ledende overlæge

Kate Juul Strandgaard
Ledende bioanalytiker