

MRSA screening

Methicillin-resistent Staphylococcus aureus

Risikosituation	Kriterier der skal være opfyldt	Under-søgelse	Isolation
1 Tidligere fået påvist MRSA	Ingen negativ MRSA-test	+	+
	Negativ MRSA-test mindst en måned efter behandling	+	-
	Dokumenteret MRSA-fri ved kontrolpodning 6 måneder eller senere efter endt bærertilstandsbehandling	-	-
2 Indenfor de sidste 6 måneder haft kontakt med MRSA-positiv person	Boet sammen med eller haft anden husstandslignende kontakt med person, der er MRSA-positiv	+	-
3 Indenfor de sidste 6 måneder modtaget behandling på hospital eller klinik i udlandet(uden for Norden)	Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer inden for de sidste 7 dage	+	+
	Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer for mere end 7 dage siden	+	-
	Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer, men der har været udført invasivt indgreb, f.eks. anlæggelse af dræn eller katetre, dialyse, syning af sår	+	-
	I denne sammenhæng anses injektioner, blodprøvetagning eller anlæggelse af perifert venekateter ikke for et invasivt indgreb		
	Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer uden invasivt indgreb	-	-
4 Indenfor de sidste 6 måneder haft direkte eller indirekte kontakt med svinebesætning	Haft arbejde ugentligt eller hyppigere i en svinestald eller på anden måde haft hyppig og tæt kontakt med levende svin	+	+
	Husstandsmedlem til person med arbejde ugentligt eller hyppigere i en svinestald eller på anden måde hyppig og tæt kontakt med levende svin	+	-
5 Indenfor de sidste 6 måneder haft ophold/arbejdet i krigszone, flygtningelejr eller ophold på asylcenter		+	-

Risikosituation 1: Kontakt Infektionshygiejnisk Enhed, hvis en tidligere MRSA-positiv patient, der endnu ikke er erklæret MRSA-fri, er fundet MRSA negativ indenfor den sidste måned. **Risikosituation 2-5:** Hvis patienten er undersøgt indenfor den sidste måned og fundet MRSA-negativ, skal patienten hverken undersøges eller isoleres ved indlæggelsen.

CPO screening

carbapenemase-producerende organismer

Risikosituation	Kriterier der skal være opfyldt	Under-søgelse	Isolation
1 Tidligere fået påvist CPO		+	+
2 Indenfor de sidste 6 måneder haft kontakt med CPO-positiv person	Boet sammen med eller haft anden husstandslignende kontakt med person, der er CPO-positiv	+	-
3 Indenfor de sidste 6 måneder modtaget behandling på hospital eller klinik i udlandet (uden for Norden)	Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer inden for de sidste 7 dage	+	+
	Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer for mere end 7 dage siden	+	-
	Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer, men der har været udført invasivt indgreb, f.eks. anlæggelse af dræn eller katetre, dialyse, syning af sår I denne sammenhæng anses injektioner, blodprøvetagning eller anlæggelse af perifert venekateter ikke for et invasivt indgreb	+	-
	Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer uden invasivt indgreb	-	-
4 Indenfor de sidste 6 måneder opholdt sig uden for Norden og fået behandling med antibiotika under opholdet		+	-
5 Indenfor de sidste 6 måneder haft ophold/arbejdet i krigszone, flygtningelejr eller ophold på asylcenter		+	-
6 Indenfor de sidste 6 måneder været i dialysebehandling eller behandling med cytostatika	Patienter i kronisk dialyse og patienter, der har været i behandling med cytostatika, som indebærer en øget risiko for infektion	+	-

Risikosituation 2-6: Hvis patienten er undersøgt indenfor den sidste måned, og ikke har været udsat for en ny risikosituation i den mellemliggende periode, skal patienten ikke undersøges ved indlæggelsen